

# Greifvogelbeobachtungen in der Mongolei

J. Matthes

In der Zeit vom 02.07. bis 18.07.1985 konnte ich an einer Touristenreise in die Mongolische Volksrepublik teilnehmen. Diese Reise war durch den Kulturbund der DDR organisiert worden und hatte insofern einen leicht fachlichen Aspekt, als die Mehrzahl der Teilnehmer naturkundlich interessiert war. So war besonders die Ornithologie und Botanik stark vertreten. Die Reisegruppe absolvierte im wesentlichen das vorgesehene Programm mit der Maßgabe, daß die Aufenthalte an lohnenden Beobachtungspunkten so lang wie möglich ausgedehnt wurden bzw. gelegentlich solchen der Vorzug vor dem eigentlichen Ziel der Tour gegeben wurde. Wie alle Touristenreisen dieser Art in die Mongolei berührte auch unsere Reisegruppe neben der Hauptstadt Ulan-Bator am Tolafluß jeweils für 2-3 Tage den Changai bei Chudshirt, die Gobi mit Gobi-Altai, Sanddünengebiet und Saxaulwald in der Nähe der "Flammenden Klippen" (Bajan Zag), den Anfang des Chentej bei Terelsch und schließlich die Südseite des Bogd-ul bei Dzun-mod. Auf weitere Orts- und Lagebeschreibungen sei hier verzichtet und auf entsprechende Arbeiten von Mauersberger (1979), Meyburg (1983) und Piechocki (1968) verwiesen. Hervorzuheben wäre aber noch, daß der Termin unserer Reise sich ausschließlich auf die Brutzeit beschränkte, der Rückzug also beendet war und ein Wegzug noch nicht wieder begonnen hatte. Folgende Arten gelangten uns zur Beobachtung:

Schneegeier (*Gyps himalayensis*)

1 oder evtl. auch 2 Expl. auf der Tour in den Gobi-Altai am 09.07.1985. Besondere Einzelheiten waren nicht festzustellen, jedoch war das Merkmal der Gattung Gyps, ein langer schlanker Hals, auch aus großer Entfernung gut zu erkennen.

Kuttengeier (*Aegypius monachus*)

Diesem Geier begegneten wir recht häufig. So im Changai-Gebiet (s.o.) 3-4 Exemplare am 04.07., jeweils einzeln, auf der Fahrt zum Orchon-Wasserfall; 1 Ex. am 05.07. an einer Wasserstelle etwa 20 Minuten vom Changailager Richtung Orchon.; 8-10 Ex. am 09.07., jeweils einzeln oder auch mal zu zweit, im Gobi-Altai, Bereich Adlerschlucht; 1 Ex. am 10.07. beim Saxaulwald; 3+2 Ex. am 13.07. kreisend über einem Bergrücken über dem Terelsch-Fluß beim Terelschlager; 5-6 Ex. am 16.07., jeweils einzeln, auf der Südseite des Bogd-ul während der Fahrt nach Dzunmod sowie dortselbst noch 2x1 Ex.

### Bartgeier (*Gypaetus barbatus*)

Diese Art sahen wir nur am 09.07. in 4x1 Ex. im Gobi-Altai im Bereich der Adlerschlucht.

### Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

Auch dem Steinadler begegneten wir nur an einer Stelle, am 04.07. auf der Fahrt zum Orchon-Wasserfall kreisten über einem Berg 1 ad. und 1 juv. Ex., sowie weiterhin 1 unbestimmtes Ex.

### Steppenadler (*Aquila nipalensis*)

1 Ex. am 03.07. Ulan Bator überliegend; 5x1 und 1x2 Ex. am 04.07 auf der Fahrt zum Orchon-Wasserfall; 3-4 x 1 Ex (1 Ex mit Beute) vormittags und 5 x 1 Ex. nachmittags am 05.07. an verschiedenen Positionen (kleinen Steppenseen) 20 Minuten südl. bzw. nordwestl. Chudshirt; 1 subad. Ex. am 09.07. in den Vorbergen zum Gobi-Altai, sowie 2x1 Ex. auf der Rückfahrt nach Dzunmod auf der Südseite des Bogd-ul.

### Zwergadler (*Hieraetus pennatus*)

1 dunkles Ex. am 13.07 über Terelsch-Aue; 1 Ex. dunkl. Phase, am 14.07 rufend, ebenda; 1 Ex. dunkl. Phase, am 16.07. am Bogd-ul bei Dzun-mod.

### Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Die am 13. und 14.07. jeweils 1-2 beobachteten Ex. unweit des Terelsch-Lagers gehörten wohl dieser Art an. Außerdem wurde 1 Horst auf einer Lärche mit 2 Jungen (Ästlinge) gefunden, der ebenfalls dieser Art zuzuordnen war.

### Hochlandbussard (*Buteo hemilasius*)

Nach dem Schwarzmilan die am häufigsten beobachtete Art. 2-3 Ex. am 03.07. auf Telegrafpfählen auf der Fahrt vom Flugplatz zur Stadt Ulan Bator; 3 x1 Ex am 04.07. auf der Fahrt zum Orchon-Wasserfall; 1 bzw. 4 x 1 Ex. und Fund eines schon ausgeflogenen Horstes am 05.07. an den beiden Positionen wie bei Steppenadler ausgeführt; 3x1 Ex. am 09.07. im Gobi-Altai; mehrfach fliegende sowie 2 Brutpaare mit Horsten mit fast flüggen Jungen am 10.07. im Gebiet des Saxaulwaldes; 5x1 Ex. am 16.07 auf der Südseite des Bogd-ul auf der Fahrt nach Dzunmod.

### Sperber (*Accipiter nisus*)

1 Ex. am 14.07 am Hang gegenüber dem Terelsch-Lager, welches wir dieser Art zuordneten.

### Habicht (*Accipiter gentilis*)

2 x 1 Weibchen am 13.07. in der Terelsch-Aue jagend kurz gesehen.

### Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Diese, der Rasse *lineatus* zuzuordnende Art, war der am häufigsten zu beobachtende Greifvogel. Er trat besonders häufig im Raum der Hauptstadt selbst auf, flog zahlreich über der Stadt herum und nistete in den Bergwäldern des Bogd-ul wo wir bei kurzen Stippvisiten mehrere Horste mit

Jungen im beginnenden Ästlingsstadium fanden. Auch in allen anderen besuchten Landschaften fehlte er nirgends, wenn er verschiedentlich auch weniger häufig war (Mangel an Nistplätzen - dann wohl nur umherstreifende Stücke)

#### Baumfalke (*Falco subbuteo*)

1 ad. Ex. am 04.07. auf der Fahrt zum Orchon-Wasserfall; 2 offensichtliche BP. am 16.07 auf Rückseite des Bogd-ul bei Dzun-mod.

#### Sakerfalke (*Falco cherrug*)

1 Ex. am 03.07. über Ulan Bator, das wohl zu dieser Art gehörte; 1 Ex. am 04.07. im Gebiet des Orchon-Wasserfalls schön kreisend sowie 2 x 1 Ex. auf dem Weg dahin; 2 x 1 Ex. am 09.07. im Gobi-Altai sowie 1 Ex. in den Vorbergen; 1 Ex. am 16.07. auf der Südseite des Bogd-ul bei Dzunmod.

#### Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

Alle beobachteten Vögel zeigten deutlich die Merkmale der Rasse *amurensis*. 1 Ex. am 06.07. morgens auf einer Telefonleitung unweit des Changaigai-Lagers bei Chudshirt; 5-6 Ex. am 16.07. auf Telefonleitung auf der Fahrt nach Dzunmod.

#### Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

1 ad. Männchen 05.07 im Changaigebiet, nachmittags ein weiteres ad. Männchen im Bereich nordwestlich des Lagers; 1 Ex. am 07.07. bei U.B. über der Tola-Aue.

### ZUSAMMENFASSUNG

Auf einer Reise, die den Verfasser in der Zeit vom 2. bis 18.7.1985 in die Mongolische Volksrepublik führte, konnten 15 Greifvogelarten beobachtet werden, 3 Geierarten, 3 Adlerarten, 4 Falkenarten, je 2 Arten der Gattungen Buteo und Accipiter sowie der Schwarzmilan.

### SUMMARY

#### Raptor Observations in Mongolia

During a trip made by the writer to the Mongolian People's Republic from 2nd to 18th August 1985, 15 different species of raptor were observed: 3 species of vulture, 3 of eagles, 4 of falcons, 2 each of unidentified Buteos and Accipiters, and the Black Kite.

### LITERATUR

- Mauersberger, G. (1979): Okofaunistische und biologische Beiträge zur Avifauna mongolica. Mitt. Zool. Mus. Berlin 55, Supp. Ann. Om. 3:99-126
- Meyburg, B.-U. & C. Meyburg (1983): Vultures in Mongolia. pp. 99-106 in S. R. Wilbur & J. A. Jackson (Ed.): Vulture Biology and Management. University of California Press: Berkeley, Los Angeles, London
- Piechocki, R. (1968): Beiträge zur Avifauna der Mongolei. Teil 1. Mitt. zool. Mus. Berlin 44: 149-292.
- Joachim Matthes, Postfach 42-03, DDR-2510 Rostock 5, German Democratic Republic.